



Comune di
CASTIGLIONE FIORENTINO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO OLIVO

07 luglio 2025



Sereno o poco nuvoloso con temperature in diminuzione rispetto alla precedente settimana. Le massime si attesteranno tra i 27 e i 30°, mentre le minime tra i 14 e i 17°. Da domenica dovrebbe esserci un rialzo delle temperature (dato da confermare nel prosieguo della settimana).

È sempre bene verificare periodicamente il meteo che, a lunga scadenza, è soggetto a variazioni. Questo anche per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.



OLIVO

FASE FENOLOGICA: accrescimento frutticino

MOSCA DELLE OLIVE – *Bractocera Oleae*

LOCALITÀ	Installate 30 giugno 2025	07 luglio 2025				
MAMMÌ	2 postazioni	0 – 1				
S. MARGHERITA	2 postazioni	1 – 0				
PIEVE DI CHIO	2 postazioni	0 – 0				

COL DI BIDONE	2 postazioni	0 – 0				
TARAGNANO SANTA CRISTINA	2 postazioni	0 – 0				
NOCETA	2 postazioni	0 – 0				
MONTECCHIO LE COMUNANZE	2 postazioni	0 – 0				
LA NAVE CASTRONCELLO BROLIO	2 postazioni	0 – 0				
COZZANO ALTO	2 postazioni	1 – 0				
BACERNE ALTE	2 postazioni	6 – 2				

Voli ancora assenti o sotto soglia. Il dato nella colonna evidenziata in giallo è quello dell'ultimo controllo. Non siamo ancora in una fase fenologica idonea per la riproduzione della mosca. Si ricorda, infatti, che, nei nostri areali, l'eventuale attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di **indurimento del nocciolo**.

Quindi, vista la fase fenologica ancora non recettiva all'attività della mosca e l'assenza di catture, **non sono necessari interventi contro questo fitofago.**

TIGNOLA DELL'OLIVO – *Prays Oleae*

La prima generazione che attacca i fiori è terminata. Installare le trappole.

Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare il tecnico.

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE – *Saissetia Oleae*

Soprattutto là dove l'anno precedente se ne fosse riscontrata la presenza, cominciare a controllare visivamente le piante per vedere se presentano questo fitofago, facilmente riconoscibile proprio per la caratteristica forma di un granello di pepe diviso a metà degli scudetti (ovvero le femmine adulte della specie), contenenti al loro interno le uova che, quando si schiudono generalmente attorno alla metà di luglio, generano numerosissime neanidi. Nei nostri areali in genere, sia per le condizioni climatiche avverse, sia per i numerosi antagonisti naturali, questo fitofago non genera grossi danni. È comunque buona norma tenerlo sotto controllo visivo contattando il tecnico se lo si ritiene necessario.

CICLOCONIO O OCCHIO DI PAVONE – *Spilocaea Oleaginea*

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati. Là dove questo non sia avvenuto, si può contattare il tecnico per una verifica o effettuarli dopo le piogge se lo si ritiene necessario.

MARGARONIA O PIRALIDE DELL'OLIVO – *Palpita Unionalis*

Questo insetto, come la Tignola dell'olivo, è un lepidottero (farfalla). Non è sempre presente in maniera consistente né uniformemente distribuito. Può causare danni alla vegetazione (giovani germogli) e, più raramente, anche alle drupe.

Compie da 4 a 5 generazioni all'anno secondo le stagioni e gli areali.

Potature e concimazioni equilibrate, limitando la vigoria di nuovi germogli, evitano grosse infestazioni. Molta attenzione va posta alla pulizia periodica dei polloni, essendo questi tra i fusti preferiti dalla piralide.

ROGNA DELL'OLIVO – *Pseudomonas Savastanoi*

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 36-48 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia la rimandiamo ai bollettini autunnali.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

TEL. 057565641

UFFICIO AMBIENTE E SVILUPPO TEL.0575656415

O IL TECNICO DELLA COLDIRETTI:

MONTESI LUIGI AL 3475560170